# Especies de la tribu Ormiini (Diptera: Tachinidae) en la colección Instituto-Fundación Miguel Lillo

En la presente nota se dan a conocer las especies de la tribu Ormiini (Diptera: Tachinidae), determinadas por la autora y depositadas en la colección Instituto-Fundación Miguel Lillo. La tribu está representada en la región Neotropical por cuatro géneros: *Euphasiopteryx* Townsend, *Opsophasiopteryx* Townsend, *Ormia* Robineau-Desvoidy y *Ormiophasia* Townsend (Guimarães, 1971). Sus integrantes son muy llamativos por la coloración amarillenta, quetotaxia reducida y por tener hábitos nocturnos (Crosskey, 1973). Se cita por primera vez para la Argentina a *Euphasiopteryx*, ampliándose la distribución de *E. dominicana* y *E. ochracea*, y también la de *E. guianica*, conocida sólo de Kartabo (Guyana). Además hay dos especies indeterminadas del género *Ormiophasia*, posiblemente nuevas, que serán descriptas oportunamente.

***Euphasiopteryx depleta*** (Wiedemann)

**Material estudiado. PERÚ.** Tingo María, 670 m s. n. m., 1 macho, W. Weyrauch.

**Distribución.** Honduras, Perú y Brasil (Tavares, 1965).

***E. dominicana*** (Townsend)

**Material estudiado. ARGENTINA. Salta:** Urundel, 1 hembra, 25/31-I-1950, R. Golbach.

**Distribución.** Estados Unidos de América, Cuba, Panamá, Guatemala y Puerto Rico (Sabrosky, 1953).

***E. guianica*** (Curran)

**Material estudiado. PERÚ.** Valle Chanchamayo, 800 m s. n. m., 1 macho, 1-X-1939, W. Weyrauch.

**Distribución.** Kartabo, Guyana (Curran, 1934).

***E. ochracea*** (Bigot)

**Material estudiado. ARGENTINA. Santiago del Estero:** Icaño, 1 hembra, 29-III/22-IV-1957, R. Golbach.

**Distribución.** Estados Unidos de América, México, Cuba, Puerto Rico, Paraguay y Brasil (Tavares, 1965).

***Ormia wygodzinskyi*** Tavares

**Material estudiado. ARGENTINA. Tucumán:** Reserva Provincial Río Cochuna, 1 macho, 16-X-1993, M. C. Gramajo (T. Malaise).

**Distribución.** Argentina (Tavares, 1965).

***O. sabroskyi*** Tavares

**Material estudiado. ECUADOR.** El Puyo, 1000 m s. n. m., 1 macho, 12-IV-1958, W. Weyrauch.

**Distribución.** Estados Unidos de América, México, Brasil y Ecuador (Tavares, 1965).

***Ormiaphasia*** spp.

**Material estudiado. ARGENTINA. Tucumán:** Horco Molle, 750 m s. n. m., 1 hembra, 24-III-1965, W. Weyrauch; 1 hembra, 27-V-1966, L. Stange.

## BIBLIOGRAFÍA CITADA


CROSSKEY, R. W. 1973. A conspectus of the Tachinidae (Diptera) of Australia, including keys to the supraspecific taxa and taxonomic and host catalogues. *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) Ent. Suppl.* 21: 1-221.

CURRAN, C. H. 1934. The Diptera of Kartabo, Bartica district, British Guiana with description of new species from other British Guiana localities. *Bull. Brit. Mus. Nat. Hist.* 66: 287-532.

GUIMARÃES, J. H. 1971. Tachinidae. *En:* N. Papavero (ed.), A catalogue of the Diptera of the Americas South of the United States, Mus. Zool. Univ. São Paulo, pp. 1-333.

SABROSKY, C. W. 1953. Taxonomy and host relations of the tribe Ormiini in the Western Hemisphere. I, II. *Proc. Entomol. Soc. Washington* 55: 167-183; 289-305.

TAVARES, O. 1965. Contribuiçao ao conhecimento da Tribo Ormiini. III. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 63: 13-25.



**GRAMAJO, MARÍA C.**
Instituto Superior de Entomología,
Facultad de Ciencias Naturales e
Instituto Miguel Lillo,
4000 San Miguel de Tucumán, Argentina.